$\pi(1300)$

$I^G(J^{PC}) = 1^-(0^{-+})$

$\pi(1300)$ MASS

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
1300±100 OUR ESTIMATE				
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
1190± 30	ZIELINSKI	84	SPEC	200 π^+ Z → Z3π
1240± 30	BELLINI	82	SPEC	40 π^- A → A3π
1273± 50	[1] AARON	81	RVUE	
1342± 20	BONESINI	81	OMEG	12 $\pi^- p \rightarrow p3\pi$
~ 1400	DAUM	81B	SPEC	63,94 $\pi^- p$

[1] Uses multichannel Aitchison-Bowler model (BOWLER 75). Uses data from DAUM 80 and DANKOWYCH 81.

$\pi(1300)$ WIDTH

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
200 to 600 OUR ESTIMATE				
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
440± 80	ZIELINSKI	84	SPEC	200 π^+ Z → Z3π
360±120	BELLINI	82	SPEC	40 π^- A → A3π
580±100	[2] AARON	81	RVUE	
220± 70	BONESINI	81	OMEG	12 $\pi^- p \rightarrow p3\pi$
~ 600	DAUM	81B	SPEC	63,94 $\pi^- p$

[2] Uses multichannel Aitchison-Bowler model (BOWLER 75). Uses data from DAUM 80 and DANKOWYCH 81.

$\pi(1300)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)
Γ_1	$\rho\pi$	seen
Γ_2	$\pi(\pi\pi)_{S\text{-wave}}$	seen
Γ_3	$f_0(1370)\pi$	

$\pi(1300)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(\pi(\pi\pi)_{S\text{-wave}})/\Gamma(\rho\pi)$ **Γ_2/Γ_1**

VALUE	DOCUMENT ID		TECN
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •			
2.12	[3] AARON	81	RVUE

[3] Uses multichannel Aitchison-Bowler model (BOWLER 75). Uses data from DAUM 80 and DANKOWYCH 81.

$\pi(1300)$ REFERENCES

ZIELINSKI	84	PR D30 1855	+Berg, Chandlee, Cihangir+	(ROCH, MINN, FNAL)
BELLINI	82	PRL 48 1697	+Frabetti, Ivanshin, Litkin+	(MILA, BGNA, JINR)
AARON	81	PR D24 1207	+Longacre	(NEAS, BNL)
BONESINI	81	PL 103B 75	+Donald+	(MILA, LIVP, DARE, CERN, BARI, BONN)
DANKOWY...	81	PRL 46 580	Dankowych+	(TNTO, BNL, CARL, MCGI, OHIO)
DAUM	81B	NP B182 269	+Hertzberger+	(AMST, CERN, CRAC, MPIM, OXF+)
DAUM	80	PL 89B 281	+Hertzberger+	(AMST, CERN, CRAC, MPIM, OXF+)
BOWLER	75	NP B97 227	+Game, Aitchison, Dainton	(OXFTP, DARE)