$K_1(1650)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(1^+)$

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

This entry contains various peaks in strange meson systems ($K^+\phi$, $K\pi\pi$) reported in partial-wave analysis in the 1600–1900 mass region.

$K_1(1650)$ MASS

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
1650±50	FRAME	86	OMEG	+	13 $K^+p \to \phi K^+p$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •					
~ 1840	ARMSTRONG	83	OMEG	–	18.5 $K^-p \to 3Kp$
~ 1800	DAUM	81C	CNTR	–	63 $K^-p \to K^-2\pi p$

$K_1(1650)$ WIDTH

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
150±50	FRAME	86	OMEG	+	13 $K^+p \to \phi K^+p$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •					
~ 250	DAUM	81C	CNTR	–	63 $K^-p \to K^-2\pi p$

$K_1(1650)$ DECAY MODES

	Mode
Γ_1	$K\pi\pi$
Γ_2	$K\phi$

$K_1(1650)$ REFERENCES

FRAME	86	NP B276 667	+Hughes, Lynch, Minto, McFadzean+	(GLAS)
ARMSTRONG	83	NP B221 1	+	(BARI, BIRM, CERN, MILA, CURIN+)
DAUM	81C	NP B187 1	+Hertzberger+	(AMST, CERN, CRAC, MPIM, OXF+)