Λ BARYONS
($S = -1$, $I = 0$)

$\Lambda^0 = uds$

Λ

$I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^+)$

Mass $m = 1115.683 \pm 0.006$ MeV
Mean life $\tau = (2.632 \pm 0.020) \times 10^{-10}$ s (S = 1.6)
$c\tau = 7.89$ cm
Magnetic moment $\mu = -0.613 \pm 0.004\ \mu_N$
Electric dipole moment $d < 1.5 \times 10^{-16}$ $e$cm, CL = 95%

Decay parameters

$p\pi^-$	$\alpha_- = 0.642 \pm 0.013$
"	$\phi_- = (-6.5 \pm 3.5)^\circ$
"	$\gamma_- = 0.76$ [g]
"	$\Delta_- = (8 \pm 4)^\circ$ [g]
$n\pi^0$	$\alpha_0 = +0.65 \pm 0.05$
$pe^-\overline{\nu}_e$	$g_A/g_V = -0.718 \pm 0.015$ [e]

Λ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$p\pi^-$	(63.9 ±0.5) %	101
$n\pi^0$	(35.8 ±0.5) %	104
$n\gamma$	(1.75±0.15) $\times 10^{-3}$	162
$p\pi^-\gamma$	[h] (8.4 ±1.4) $\times 10^{-4}$	101
$pe^-\overline{\nu}_e$	(8.32±0.14) $\times 10^{-4}$	163
$p\mu^-\overline{\nu}_\mu$	(1.57±0.35) $\times 10^{-4}$	131

$\Lambda(1405)$ S_{01}

$I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^-)$

Mass $m = 1407 \pm 4$ MeV
Full width $\Gamma = 50.0 \pm 2.0$ MeV
Below $\overline{K}N$ threshold

$\Lambda(1405)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$\Sigma\pi$	100 %	152

$\Lambda(1520)$ D_{03} $I(J^P) = 0(\frac{3}{2}^-)$

Mass $m = 1519.5 \pm 1.0$ MeV [i]
Full width $\Gamma = 15.6 \pm 1.0$ MeV [i]
$p_{\text{beam}} = 0.39$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 82.8$ mb

$\Lambda(1520)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	45 ± 1%	244
$\Sigma\pi$	42 ± 1%	267
$\Lambda\pi\pi$	10 ± 1%	252
$\Sigma\pi\pi$	0.9 ± 0.1%	152
$\Lambda\gamma$	0.8 ± 0.2%	351

$\Lambda(1600)$ P_{01} $I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^+)$

Mass $m = 1560$ to 1700 (≈ 1600) MeV
Full width $\Gamma = 50$ to 250 (≈ 150) MeV
$p_{\text{beam}} = 0.58$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 41.6$ mb

$\Lambda(1600)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	15–30 %	343
$\Sigma\pi$	10–60 %	336

$\Lambda(1670)$ S_{01} $I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^-)$

Mass $m = 1660$ to 1680 (≈ 1670) MeV
Full width $\Gamma = 25$ to 50 (≈ 35) MeV
$p_{\text{beam}} = 0.74$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 28.5$ mb

$\Lambda(1670)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	15–25 %	414
$\Sigma\pi$	20–60 %	393
$\Lambda\eta$	15–35 %	64

$\Lambda(1690)\ D_{03}$ $\quad I(J^P) = 0(\frac{3}{2}^-)$

Mass $m = 1685$ to 1695 (≈ 1690) MeV
Full width $\Gamma = 50$ to 70 (≈ 60) MeV
$p_{\text{beam}} = 0.78$ GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 26.1$ mb

$\Lambda(1690)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	20–30 %	433
$\Sigma\pi$	20–40 %	409
$\Lambda\pi\pi$	~ 25 %	415
$\Sigma\pi\pi$	~ 20 %	350

$\Lambda(1800)\ S_{01}$ $\quad I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^-)$

Mass $m = 1720$ to 1850 (≈ 1800) MeV
Full width $\Gamma = 200$ to 400 (≈ 300) MeV
$p_{\text{beam}} = 1.01$ GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 17.5$ mb

$\Lambda(1800)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	25–40 %	528
$\Sigma\pi$	seen	493
$\Sigma(1385)\pi$	seen	345
$N\overline{K}^*(892)$	seen	†

$\Lambda(1810)\ P_{01}$ $\quad I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^+)$

Mass $m = 1750$ to 1850 (≈ 1810) MeV
Full width $\Gamma = 50$ to 250 (≈ 150) MeV
$p_{\text{beam}} = 1.04$ GeV/c $\quad 4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 17.0$ mb

$\Lambda(1810)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	20–50 %	537
$\Sigma\pi$	10–40 %	501
$\Sigma(1385)\pi$	seen	356
$N\overline{K}^*(892)$	30–60 %	†

$\Lambda(1820)\ F_{05}$ $I(J^P) = 0(\frac{5}{2}^+)$

Mass $m = 1815$ to 1825 (≈ 1820) MeV
Full width $\Gamma = 70$ to 90 (≈ 80) MeV
$p_{\text{beam}} = 1.06$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 16.5$ mb

$\Lambda(1820)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	55–65 %	545
$\Sigma\pi$	8–14 %	508
$\Sigma(1385)\pi$	5–10 %	362

$\Lambda(1830)\ D_{05}$ $I(J^P) = 0(\frac{5}{2}^-)$

Mass $m = 1810$ to 1830 (≈ 1830) MeV
Full width $\Gamma = 60$ to 110 (≈ 95) MeV
$p_{\text{beam}} = 1.08$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 16.0$ mb

$\Lambda(1830)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	3–10 %	553
$\Sigma\pi$	35–75 %	515
$\Sigma(1385)\pi$	>15 %	371

$\Lambda(1890)\ P_{03}$ $I(J^P) = 0(\frac{3}{2}^+)$

Mass $m = 1850$ to 1910 (≈ 1890) MeV
Full width $\Gamma = 60$ to 200 (≈ 100) MeV
$p_{\text{beam}} = 1.21$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 13.6$ mb

$\Lambda(1890)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	20–35 %	599
$\Sigma\pi$	3–10 %	559
$\Sigma(1385)\pi$	seen	420
$N\overline{K}^*(892)$	seen	233

$\Lambda(2100)$ G_{07} $I(J^P) = 0(\frac{7}{2}^-)$

Mass $m = 2090$ to 2110 (≈ 2100) MeV
Full width $\Gamma = 100$ to 250 (≈ 200) MeV
$p_{\text{beam}} = 1.68$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 8.68$ mb

$\Lambda(2100)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	25–35 %	751
$\Sigma\pi$	~ 5 %	704
$\Lambda\eta$	<3 %	617
ΞK	<3 %	483
$\Lambda\omega$	<8 %	443
$N\overline{K}^*(892)$	10–20 %	514

$\Lambda(2110)$ F_{05} $I(J^P) = 0(\frac{5}{2}^+)$

Mass $m = 2090$ to 2140 (≈ 2110) MeV
Full width $\Gamma = 150$ to 250 (≈ 200) MeV
$p_{\text{beam}} = 1.70$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 8.53$ mb

$\Lambda(2110)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	5–25 %	757
$\Sigma\pi$	10–40 %	711
$\Lambda\omega$	seen	455
$\Sigma(1385)\pi$	seen	589
$N\overline{K}^*(892)$	10–60 %	524

$\Lambda(2350)$ H_{09} $I(J^P) = 0(\frac{9}{2}^+)$

Mass $m = 2340$ to 2370 (≈ 2350) MeV
Full width $\Gamma = 100$ to 250 (≈ 150) MeV
$p_{\text{beam}} = 2.29$ GeV/c $4\pi\lambda\!\!\!^{-2} = 5.85$ mb

$\Lambda(2350)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$N\overline{K}$	~ 12 %	915
$\Sigma\pi$	~ 10 %	867