Ω BARYONS
$(S = -3, I = 0)$

$\Omega^- = sss$

$\boxed{\Omega^-}$ $\qquad\qquad\qquad I(J^P) = 0(\frac{3}{2}^+)$

J^P is not yet measured; $\frac{3}{2}^+$ is the quark model prediction.

Mass $m = 1672.45 \pm 0.29$ MeV
Mean life $\tau = (0.822 \pm 0.012) \times 10^{-10}$ s
$\quad c\tau = 2.46$ cm
Magnetic moment $\mu = -2.02 \pm 0.05$ μ_N

Decay parameters

ΛK^-	$\alpha = -0.026 \pm 0.026$
$\Xi^0 \pi^-$	$\alpha = 0.09 \pm 0.14$
$\Xi^- \pi^0$	$\alpha = 0.05 \pm 0.21$

Ω^- DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	Confidence level	p (MeV/c)
ΛK^-	(67.8 ± 0.7) %		211
$\Xi^0 \pi^-$	(23.6 ± 0.7) %		294
$\Xi^- \pi^0$	(8.6 ± 0.4) %		290
$\Xi^- \pi^+ \pi^-$	$(4.3^{+3.4}_{-1.3}) \times 10^{-4}$		190
$\Xi(1530)^0 \pi^-$	$(6.4^{+5.1}_{-2.0}) \times 10^{-4}$		17
$\Xi^0 e^- \overline{\nu}_e$	$(5.6 \pm 2.8) \times 10^{-3}$		319
$\Xi^- \gamma$	$< 4.6 \quad\times 10^{-4}$	90%	314
$\Delta S = 2$ forbidden ($S2$) modes			
$\Lambda \pi^-$	$S2 \quad < 1.9 \quad\times 10^{-4}$	90%	449

$\boxed{\Omega(2250)^-}$ $\qquad\qquad\qquad I(J^P) = 0(?^?)$

Mass $m = 2252 \pm 9$ MeV
Full width $\Gamma = 55 \pm 18$ MeV

$\Omega(2250)^-$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$\Xi^- \pi^+ K^-$	seen	531
$\Xi(1530)^0 K^-$	seen	437