$\eta_2(1645)$

$I^G(J^{PC}) = 0^+(2^{-+})$

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

$\eta_2(1645)$ MASS

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
1617± 5 OUR AVERAGE					
1613± 8	BARBERIS	00B			450 $pp \to p_f \eta \pi^+ \pi^- p_s$
1617± 8	BARBERIS	00C			450 $pp \to p_f 4\pi p_s$
1620±20	BARBERIS	97B	OMEG		450 $pp \to pp2(\pi^+\pi^-)$
1645±14±15	ADOMEIT	96	CBAR	0	1.94 $\overline{p}p \to \eta 3\pi^0$

$\eta_2(1645)$ WIDTH

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
181±11 OUR AVERAGE					
185±17	BARBERIS	00B			450 $pp \to p_f \eta \pi^+ \pi^- p_s$
177±18	BARBERIS	00C			450 $pp \to p_f 4\pi p_s$
180±25	BARBERIS	97B	OMEG		450 $pp \to pp2(\pi^+\pi^-)$
$180^{+40}_{-21}\pm25$	ADOMEIT	96	CBAR	0	1.94 $\overline{p}p \to \eta 3\pi^0$

$\eta_2(1645)$ DECAY MODES

	Mode
Γ_1	$a_2(1320)\pi$
Γ_2	$K\overline{K}\pi$
Γ_3	$K^*\overline{K}$
Γ_4	$\eta\pi^+\pi^-$
Γ_5	$a_0(980)\pi$
Γ_6	$f_2(1270)\eta$

$\eta_2(1645)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(K\overline{K}\pi)/\Gamma(a_2(1320)\pi)$ Γ_2/Γ_1

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
0.07 ±0.03	[1] BARBERIS	97C	OMEG	450 $pp \to pp K\overline{K}\pi$

[1] Using $2(\pi^+\pi^-)$ data from BARBERIS 97B.

$\Gamma(a_2(1320)\pi)/\Gamma(a_0(980)\pi)$ Γ_1/Γ_5

VALUE	*DOCUMENT ID*		*COMMENT*
13.0±2.7	BARBERIS	00B	450 $pp \to p_f \eta \pi^+ \pi^- p_s$

$\Gamma(f_2(1270)\eta)/\Gamma_{total}$ Γ_6/Γ

VALUE	*DOCUMENT ID*		*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •			
not seen	BARBERIS	00B	450 $pp \to p_f \eta \pi^+ \pi^- p_s$

$\eta_2(1645)$ REFERENCES

BARBERIS	00B	PL B471 435	D. Barberis *et al.*	(WA 102 Collab.)
BARBERIS	00C	PL B471 440	D. Barberis *et al.*	(WA 102 Collab.)
BARBERIS	97B	PL B413 217	D. Barberis *et al.*	(WA 102 Collab.)
BARBERIS	97C	PL B413 225	D. Barberis *et al.*	(WA 102 Collab.)
ADOMEIT	96	ZPHY C71 227	J. Adomeit *et al.*	(Crystal Barrel Collab.)